

중근당 중근당의 iLet 특허 공법으로 정제사이즈가 작아졌습니다
(innovative Low excipient tablet)

일반의약품

항산화제를 함유한
고함량 기능성 활성비타민

벤포벨[®]정 B

| 벤포티아민 100mg |
| UDCA 30mg |

육체피로 입안염
1일 1회 1정
체력저하 눈의피로 근육통

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고
약과 함께 보관하십시오.

[유효성분] 1정 중

벤포티아민(KP)	100.0mg	(티아민염산염으로서 72.31mg)
리보플라빈(KP)	100.0mg	
피리독신염산염(KP)	100.0mg	
시아노코발라민 1%(별규)	10.0mg	(시아노코발라민으로서 100μg)
우르소데옥시콜산(KP)	30.0mg	
니코틴산아미드(KP)	10.0mg	
비오틴(USP)	10.0μg	
산화아연(KP)	30.0mg	(아연으로서 24mg)
유비데카레논(KP)	2.0mg	
γ-오리자놀(KP)	5.0mg	
이노시톨(KP)	50.0mg	
제피아스코르브산(별규)	51.3mg	(아스코르브산으로서 50mg)

콜레칼시페롤과립(EP)	10.0mg	(비타민D로서 1,000IU)
토코페롤아세테이트2배산(KP)	40.0mg	(비타민E로서 20IU)
판토텐산칼슘(KP)	5.0mg	
폴산(KP)	10.0μg	
첨가제(타르색소) : 청색 2호		
기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 바닐라미크론, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(03B62869), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 셀크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스		

- [효능·효과]**
- 1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급**
- 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 발육기
 - 노년기
- 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.**
- 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의피로

- 3. 아연의 보급**
- [용법·용량]**
만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

- [사용상의 주의사항]**
- 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.**
- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - (4) 신장(콩팥)결석 환자
- 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.**
- (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파
- 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.**

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)을 일으킬 수 있습니다.
- (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- (8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우(다음 각호의 배합성분별 이상반응을 기재 하십시오.)
 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 하십시오.
- (10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30°C)

【성상】 황갈색의 장방형 필름코팅정

【포장단위】 30정/병, 60정/병, 120정(60정/병 X 2)

【소비자상담실】 080-6776-080(수신자부담)

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 파손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

®=등록상표

【제조의뢰자】



중근당



본사 : 서울특별시 서대문구 총정로 8 (충정로3가)
 공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
 구인처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

소 비 자 중 심 경 영
 공정거래위원회 | 한국소비자원

【제조사】



한국코러스(주) / 충청북도 제천시 강저로 30

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2020. 06. 12)이후 변경된 내용은 중근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.