



일반의약품

제품정보 QR코드



메코발라민 500 μ g을 보강한
고함량 기능성 활성비타민

벤포벨[®]에스

| 벤포티아민 100mg |
| UDCA 60mg, 타우린 100mg |



신경통 | 관절통
1일 1회 1정
육체피로 | 체력저하 | 구내염

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【유효성분】 1정 (1126.00mg) 중

벤포티아민(KP).....	100.00mg	(티아민염산염으로서 72.31mg)
d-비오틴(USP).....	0.20mg	
폴산(KP).....	0.40mg	
메코발라민(JP).....	0.50mg	
비스벤티아민(KP).....	30.00mg	(티아민염산염으로서 26.25mg)
이노시톨(KP).....	50.00mg	
리보플라빈(KP).....	100.00mg	
피리독신염산염(KP).....	100.00mg	
오르트산수화물(KP).....	25.00mg	
콜린타르타르산염(USP).....	50.00mg	

농축콜레칼시페롤과립(BP).....	10.00mg	(비타민D로서 1,000IU)
산화아연(KP).....	20.00mg	(아연으로서 16.07mg)
산화마그네슘(KP).....	30.00mg	(마그네슘으로서 18.10mg)
타우린(JP).....	100.00mg	
DL-메티오닌(USP).....	15.00mg	
우르소데옥시콜산(JP).....	60.00mg	
판토탄산칼슘(KP).....	100.00mg	

기타첨가제 : 경질수수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(OY-C- 7000A), 오파드라이III노란색(88A620053), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 코포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1) 다음 경우의 비타민 D, B1, B2, B6의 보급

· 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기

2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3) 아연의 보급

【용법·용량】

만 19세이상 및 성인 : 1일 1회, 1일 1정

【사용상의 주의사항】

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - (4) 신장장애 환자
 - (5) 저단백혈증 환자
 - (6) 신장결석 병력이 있는 환자
 - (7) 임부
 - (8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증, 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질 성유제를 신중히 투여해야 하는 환자 및 임부, 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 고령자
- 4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종, 복부불쾌감, 변비, 발진
 - (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - (4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - (5) 항알도스테론제, 트리아메테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - (6) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
 - (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 6) 저장상의 주의사항
- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관 하십시오.
 - (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【성상】 연한 갈색의 장방형 필름코팅정

【포장단위】 120 정/상자((60정/병 x 2))

【소비자상담실】 080-6776-080(수신자부담)

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 파손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품

®=등록상표



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
 구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

* 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2022.04.11)이후 변경된 내용은 중근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.